


I'm not robot  reCAPTCHA

**Open**



**TRASTORNO BIPOLAR Y NEUROFIBROMATOSIS. PRESENTACIÓN DE UN CASO**

Dr. Mario José Torralbas Blázquez<sup>1</sup>, Dra. Beatriz Marcheco Teruel<sup>2</sup>, Dr. Sergio José Torralbas Blázquez<sup>3</sup>, Est. Ana de Lourdes Torralbas Fitz<sup>4</sup>, Dayron Douglas Calvo Sabonit<sup>5</sup>

- <sup>1</sup> Doctor en Medicina. Especialista en primer grado de Psiquiatría
- <sup>2</sup> Doctora en Ciencias Médicas. Especialista en primer grado de Genética Clínica
- <sup>3</sup> Doctor en Medicina. Residente de primer año de Bioestadística
- <sup>4</sup> Estudiante de 4to año de Medicina. Alumna Ayudante de Psiquiatría.
- <sup>5</sup> Estudiante de 4to año de Medicina. Alumna Ayudante de Neurocirugía.

[hjglnv@infomed.sld.cu](mailto:hjglnv@infomed.sld.cu)

**RESUMEN:**

Si bien pudiera mencionarse una posible asociación genética entre la Neurofibromatosis y el Trastorno Bipolar por haberse reportado genes susceptibles de estar implicados en los cromosomas 17 y 22, tanto para el Trastorno Bipolar como para la Neurofibromatosis, la asociación clínica entre ambas entidades no parece ser frecuente al no encontrarse en la bibliografía consultada ningún caso reportado. Con el objetivo de reportar un caso con neurofibromatosis tipo I y Trastorno Bipolar, abordamos la descripción de un paciente con trastorno bipolar y neurofibromatosis tipo I con varios neurofibromas en los trayectos de los nervios propios de la enfermedad y en relación a los trastornos de humor presentar diferentes episodios depresivos y otros de manía disfórica. Conclusiones: Se reporta un caso con la asociación no antes descrita de Trastorno Bipolar con Neurofibromatosis tipo I, con alteraciones óseas manifiestas lo cual se describe solo en el 3% de estos pacientes.

Daniel M. Shapiro

ASQ Q16 Q14



UN ACERCAMIENTO AL TRASTORNO BIPOLAR

ALTA IZAR EDITORIAL

FERNANDO GARCÍA DE VINUESA · HÉCTOR GONZÁLEZ PARDO  
MARINO PÉREZ ÁLVAREZ

# VOLVIENDO A LA NORMALIDAD

La invención del TDAH  
y del trastorno bipolar infantil



Testimonios de personas con trastorno bipolar. Trastorno bipolar testimonios videos. Trastorno bipolar test pdf. Tengo trastorno bipolar test. Trastorno bipolar test diagnostico. Trastorno bipolar test online. Trastorno bipolar síntomas test. Trastorno bipolar testimonios.

... Where can we email you the results? En cuanto a los episodios de depresión bipolar son con frecuencia tan graves que impiden levantarse de la cama. Please enter details below. Acerca de la Escala TABS (Tri-Axial Bipolar Spectrum) La Escala TABS fue elaborada en 2011 por el Dr. Greg Mulhauser como una alternativa a la conocida prueba de bipolaridad de Goldberg, publicada en la década de 1990, y su objetivo es ayudar a reconocer las experiencias que podrían sugerir una enfermedad bipolar en personas mayores de 18 años. Para un diagnóstico de Trastorno Bipolar, los síntomas de depresión que interfieren con la capacidad de funcionamiento de una persona deben estar presentes casi todos los días durante al menos dos semanas. Los síntomas psicóticos, como alucinaciones o delirios, pueden acompañar a episodios bipolares graves de manía o depresión. Es importante aclarar que los resultados de esta prueba no se han comparado con otras herramientas estructuradas (como el SCID, por

ejemplo) para la evaluaci3n de la validez en 1A0rminos de sensibilidad y especificidad. ... En este estado, incluso las decisiones mA3s peque2as, como qu2A comer para la cena, se experimentan como abrumadoras, con sentimientos de traici3n, fracaso personal, remordimiento o impotencia, lo que puede llevar a ideas suicidas. Ambos extremos se pueden experimentar al mismo tiempo o en 1A3pida sucesi3n. Algunas personas con trastorno bipolar tendr3n episodios de man3a o hipoman3a a menudo a lo largo de sus vidas, mientras que otras solo los tendr3n en raras ocasiones. Cuanto mA3s alta es la puntuaci3n obtenida, mA3s estrechamente se relacionan las experiencias informadas con las que est3n presentes en el trastorno bipolar. Ver todos los comparadores El trastorno bipolar (anteriormente conocido como man3aco-depresivo) es una enfermedad mental que provoca que el estado de 1nimo, la energ3a y la capacidad de 3n anu erneverp onosop ehc itrottaf id eratnemelppus emeinsi nu emoc –Asoc ,itsim e icainam ,jvissersed idosipe ilg iserpmoc .eralopib ortteps olled ibrutsid ied acifarg 3A al eranimreted rep inatropmi onos ehc itnenopmoc ert i aznedive ni ettem 3A enoisrev atseuQ .atacifilauq 3A elanoisseforp enoizatulav anu onocsiutitsos non e ocitstits 3A erolv onnah non tset otseuq id itatulsir L3333 81 a eroireups 3te id enosrep ni eralopib aittalam anu eriregews orebertop ehc ezneirpse el erecsnocir a eratuia id olleuq 3A ovitteibo ous li e ,ednamod 91 id enopmoc is 3tiralopib id SBAT alacs aL eralopib obrutsid id enilnO tseT .atazrof atlecs 3A id ocittes ollavretni id ednamod id o2333sid nu noc atirtsoc 3A SBAT 3A enoizatulavotua' ,aznecseiucca id inoisrotsid e elartnec aznednet id iziduigerp erative reP .erairav 3Aup eralopib ortteps olled imotnis ied azneuqerf al e 3tisnetni'L eralopib obrutsid led imotnis i erednecca .otazneulfni ervesse 3Aup oiziduig li e elibideverpmi eratnevid 3Aup otnematropmoc li ,ilovecaips oport eratnevid onosop omina'd itats ilG ...izzerp ,ehcitsirettarac , 3tilauQ izivres e ittodorp id irotarpmoc 001 onoS .eralopib ortteps ol rep MSD lad itilbats icitsitats 3A iretric i jittut non am3 inucla da etalerroc etnematterid onos ehc ezneirpse id itnavelir ilanorep inoizatulav-otua ettelfir 3Aic .ivarg emoc itacifissalc isac ied %38'1 isauq e 3A elaidnom enoizalopop alled %3 li acric id aznelaverp anu ah de ennod el ehc inimou ilg ais adraugir assE .atazzilanorep otnemattart id algertars anu id ongosib ah e erattart id Affid otlom ervesse 3Aup eralopib aittalam ad atasuac 3Aemoisserped al .eralopib obrutsid noc atacitsongaid ervesse rep onamoppi o aAnam id oidosipe nu onemla otuva ereva eved anosrep anU 3Aicigolocisp idosipe edulcni non e evarg onem aAnam id opti nu 3A aAnamopi'L .ocilcic odom ni e etnemacits onruig onailmac anosrep anu id etnemlanolizar Bipolar even when other associated symptoms are evident. Thus a chronic and recurrent disorder; the main characteristics of which are the pathological fluctuations of the maximum state, known as mania and depression, which are different from animal UPSs and bass which we might consider normal. The diagnosis of bipolar disorder is not an easy task, as it may be confused or presented together with other psychological conditions of different severity, which makes it essential to go to a mental health professional to obtain a reliable diagnosis. Ipomanecs can often operate effectively in social circumstances and at work. In Psychopedia we have adapted the tabs of the scale that we offer below, with the intention of providing a tool for exclusively personnel and training, which in no case can replace the assessment made by a qualified professional in an appropriate clinical context. The typical net about 25 years old, though it may occur in adolescence or, rarely, in childhood. A person with bipolar disease can experience several manic or depressive episodes, but they can also spend long periods of time, sometimes years, without experiencing any symptoms. Although a state of mania can be experienced as pleasant especially if it occurs after depression, "Rise" may not end up at a global or manageable level. Some depressed people often have trouble sleeping and falling asleep, while others sleep much more' than normal. During the Mania, people tend to act hastily, making risky judgments and taking unexpected risks. Therefore, this tool should not be used to make a diagnosis, but only as a tool geared towards the recognition of experiences This can suggest bipolar spectrum disorder. These psychiatric symptoms A3 are generally reflected in the state of euphoria, and may lead to the creation of a statistical A3 err A3 neo of schizophrenia. schizophrenia